

Критерий Стьюдента $t(p_0; f)$

f	p_0		
	0,90	0,95	0,99
2	2,920	4,303	9,925
3	2,353	3,182	5,841
4	2,132	2,776	4,604
5	2,015	2,571	4,032
6	1,943	2,447	3,707
7	1,895	2,362	3,499
8	1,860	2,306	3,355
9	1,833	2,262	3,250
10	1,812	2,228	3,169
12	1,782	2,179	3,055
14	1,761	2,145	2,977
16	1,746	2,120	2,921
18	1,734	2,101	2,878
20	1,725	2,086	2,845
25	1,708	2,060	2,787
30	1,697	2,042	2,750
40	1,684	2,021	2,704
60	1,671	2,000	2,660

Критерий грубых ошибок $\xi_{\max}(p_0; n)$

n	p_0		
	0,90	0,95	0,99
3	1,41	1,41	1,41
4	1,64	1,69	1,72
5	1,79	1,87	1,96
8	2,04	2,17	2,37
10	2,15	2,29	2,54
15	2,33	2,49	2,80
20	2,45	2,62	2,96
25	2,54	2,72	3,07

Критерий Фишера $F(p_0 = 0,95)$

f для S_{\min}	f для S_{\max}						
	2	3	4	5	6	7	8
2	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37
3	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85
4	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04
5	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82
6	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15
7	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73
8	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44